

ERRADIC GRANULADO

Rodenticida anticoagulante / cebo envenenado granulado
BROMADIOLONA

COMPOSICIÓN QUIMICA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ingrediente activo: | P/P |
| Bromadiolona: 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenil-propil]-4-hidroxi-2H-1-benzopirán-2-ona. | 0.005 |
| Ingredientes Inertes: | |
| Atrayentes y vehículos. | 99.995 |
| Total | 100 |

Contiene: 0.5 gramos de i.a por kilo de producto formulado

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA LLAME AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES, TELÉFONO 223 10 28

NO. REGISTRO MINSA **1007-P-555**

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO:

ERRADIC GRANULADO es un rodenticida anticoagulante de segunda generación de una sola dosis, que elimina ratas y ratones en el ámbito urbano.

Se recomienda colocar el cebo dentro de madrigueras, agujeros, grietas, lugares poco accesibles para los humanos y otros animales no objetivos del cebo. Se recomienda colocar trampas en el perímetro de las construcciones urbanas a lo largo de los muros, donde se hayan observado excretas con mayor frecuencia, también en las áreas donde se observen daños por roedores. Maneje el producto utilizando guantes para evitar contaminar el cebo.

No coma, fume o beba durante el manejo y aplicación, después de colocar el producto lávese las manos con agua y jabón.

EL MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO JUNTO CON LAS PLAGAS QUE CONTROLA SE ENLISTAN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

| PLAGAS | ÁREAS URBANAS | ÁREAS EXTERIORES |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rattus norvegicus</i> Rata de la alcantarilla | Usar de 50 a 100 g por cebadero a intervalos de 5 a 10 m para el control de ratas. | Usar 25 gramos por cada cebadero. Colocar los cebos a la entrada de las madrigueras, cerca de los daños y en los caminos de los roedores a través de la vegetación. |
| <i>Rattus rattus</i> Rata de los tejados | Revisar las áreas o las estaciones de cebado. | Usar de 1 a 3 kg por hectárea y por aplicación, según el grado de infestación. Repetir las aplicaciones de ERRADIC hasta que los roedores no coman el cebo. |
| <i>Mus musculus</i> Ratón doméstico | Repetir la dosis hasta que no haya consumo. | |

AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD:

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (overol de algodón, guantes y botas de neopreno).



PREPARACIÓN EL PRODUCTO Y DOSIS: Este producto viene listo para su uso no es necesario preparar ninguna mezcla, coloque la cantidad especificada en el cuadro anterior donde haya observado movimiento de los roedores y ¡listo!

USO RECOMENDADO: Ver cuadro anterior. Revisar diariamente las trampas, recebar si es necesario. Repetir hasta que dejen de observarse indicios de actividad de ratas y ratones.

ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN ANIMALES Y ECOLOGÍA: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para los animales de sangre caliente.



INFORMACIÓN ADICIONAL: Coloque este producto en trampas para evitar que otro tipo de animales tengan acceso al Erradic.

¡ALTO!

¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (overol de algodón, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante el manejo y la aplicación del producto. Manténgase almacenado bajo llave alejado del alcance de los niños, animales y forrajes. Destruya los envases vacíos para evitar que sean reutilizados. Queme y entierre todos los roedores muertos y restos de cebo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN. La ingestión del producto puede causar dolor epigástrico, náusea, vómito, salivación, cansancio, vértigo y días después hemorragias internas. Por inhalación irritación de vías respiratorias y/o hemorragia nasal. Puede absorberse por piel y causar enrojecimiento, picor, sensación de dolor. En los ojos puede causar irritación temporal.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Solicitar ayuda inmediatamente.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: El tratamiento debe ser sintomático y de Soporte.

Administrar tratamiento con dosificación específica de Fitonadiona Vitamina K1 por vía intramuscular, oral o intravenosa.

Lleve el paciente al médico

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado

de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C. V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

Formulado por:

QUIMIX S.A. de C.V.
Av. Central 206 2^{do}. Piso.
San Pedro de los Pinos,
C. P. 01180, México D. F.
Tel: 5278 4680 Fax 5278 4679

Importado y distribuido por:

QUIMIX DE COSTA RICA Q. C. R. S. A.
Danza del Sol Curridabat Casa 2H

San José Costa Rica